

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina	Škodlivý činiteľ	Koncentrácia v %	Dávka do 10L vody / na 100m ²	Čakacia lehota v dňoch	Povolené kombinácie a poznámky
<u>okrasné rastliny</u>	<u>Žraví a cicaví škodcovia</u>		3-5 ml	3 dni	od začiatku výskytu, aplikovať do stekania
<u>zemiaky</u>	<u>Pásavka zemiaková</u>		3-3,5 ml	14 dní	dávka do 4L vody, podľa signalizácie ošetríte v období maximálneho liahnutia lariev do štádia L3
<u>rajčiak</u>	<u>Pásavka zemiaková</u>		3-3,5 ml	14 dní	dávka do 4L vody, podľa signalizácie ošetríte v období maximálneho liahnutia lariev do štádia L3
<u>ovocné dreviny</u>	<u>Žraví a cicaví škodcovia</u>		3-3,5 ml	28 dní	dávka do 10L vody, od začiatku výskytu, aplikovať do stekania
<u>jablone</u>	<u>Obaľovač jablčný (1. generácia)</u>		6-7 ml	28 dní	od začiatku výskytu, aplikovať do stekania
<u>jablone</u>	<u>Obaľovač jablčný (2. generácia)</u>		6-7 ml	28 dní	od začiatku výskytu, aplikovať do stekania
<u>čerešne</u>	<u>Vrtivka čerešňová</u>		6-7,5 ml	7 dní	podľa signalizácie, aplikovať do stekania
<u>višne</u>	<u>Vrtivka čerešňová</u>		6-7,5 ml	7 dní	podľa signalizácie, aplikovať do stekania
<u>jahody</u>	<u>Kvetovka jahodová</u>		5 ml	3 dni	dávka do 6L vody, pred kvitnutím
<u>reďkovka</u>	<u>Blyskáčik repkový</u>		3-5 ml	7 dní	dávka do 4L vody, od začiatku výskytu
<u>reďkovka</u>	<u>Krytonos repkový</u>		3-5 ml	7 dní	dávka do 4L vody, od začiatku výskytu
<u>reďkovka</u>	<u>Krytonos štvorzubý</u>		3-5 ml	7 dní	dávka do 4L vody, od začiatku výskytu
<u>reďkovka</u>	<u>Húsenice</u>		3-5 ml	7 dní	dávka do 4L vody, od začiatku výskytu

<u>redkovka</u>	<u>Piliarka repková</u>		3-5 ml	7 dní	dávka do 4L vody, od začiatku výskytu
<u>redkovka</u>	<u>Skočky</u>		3-5 ml	7 dní	dávka do 4L vody, od začiatku výskytu
<u>kapustová zelenina</u>	<u>Skočky na hlúbovinách</u>		3-5 ml	7 dní	dávka do 4L vody, od začiatku výskytu
<u>kapustová zelenina</u>	<u>Piliarka repková</u>		3-5 ml	7 dní	dávka do 4L vody, od začiatku výskytu
<u>kapustová zelenina</u>	<u>Húseničky môr</u>		3-5 ml	7 dní	dávka do 4L vody, od začiatku výskytu
<u>kapustová zelenina</u>	<u>Húseničky mlynárika kapustového</u>		3-5 ml	7 dní	dávka do 4L vody, od začiatku výskytu
<u>kapustová zelenina</u>	<u>Krytonos repkový</u>		3-5 ml	7 dní	dávka do 4L vody, od začiatku výskytu
<u>kapustová zelenina</u>	<u>Krytonos štvorzubý</u>		3-5 ml	7 dní	dávka do 4L vody, od začiatku výskytu
<u>kapustová zelenina</u>	<u>Blyskáčik repkový</u>		3-5 ml	7 dní	dávka do 4L vody, od začiatku výskytu
<u>hrach</u>	<u>Vošky na strukovinách</u>		3-3,5 ml	7 dní	dávka do 4L vody, podľa signalizácie
<u>hrach</u>	<u>Strapky na strukovinách</u>		3-3,5 ml	7 dní	dávka do 4L vody, podľa signalizácie
<u>cibuľa</u>	<u>Mínerka pórová</u>		5 ml	10 dní	dávka do 4L vody, podľa signalizácie
<u>pór</u>	<u>Mínerka pórová</u>		5 ml	10 dní	dávka do 4L vody, podľa signalizácie
<u>vinič</u>	<u>Obaľovače na viniči</u>		6-7,5 ml	21 dní	podľa signalizácie, aplikovať do stekania