

## Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina	Škodlivý činiteľ	Koncentrácia v %	Dávka do 10 L vody na 100m <sup>2</sup>	Čakacia lehota v dňoch	Povolené kombinácie a poznámky
cibuľa	<u>Pleseň cibuľová</u>		15g	AT	aplikujte preventívne
kôstkoviny	<u>Monílio hniloba ovocia</u>		7,5g	7	Prvú aplikáciu vykonajte počas kvitnutia v predpísanej dávke. Podľa tlaku choroby doporučujeme 2 maximálne 3 aplikácie za sezónu, pričom posledná aplikácia by mala byť vykonaná najneskôr 7 dní pred zberom.
kôstkoviny	<u>Monílio usychanie kvetov a výhonkov kôstkovín</u>		7,5g	7	Prvú aplikáciu vykonajte počas kvitnutia v predpísanej dávke. Podľa tlaku choroby doporučujeme 2 maximálne 3 aplikácie za sezónu, pričom posledná aplikácia by mala byť vykonaná najneskôr 7 dní pred zberom.
<u>NIŽŠIE JE UVEDENÉ MENEJ VÝZNAMNÉ POUŽITIE</u>					
jadroviny	<u>skladové choroby</u>		7,5 g	15 dní	
slivky	<u>Hrdza sliviek</u>		2,5 g	7 dní	maximálne 3x za sezónu, Tranzschelia prunispinosae
čerešne	<u>Hnednutie listov</u>		2,5 g	7 dní	maximálne 3x za sezónu, Gnomonia erythrostoma
čerešne	<u>Škvritosť listov čerešní a višní</u>		2,5 g	7 dní	maximálne 3x za sezónu
višne	<u>Hnednutie listov</u>		2,5 g	7 dní	maximálne 3x za sezónu, Gnomonia erythrostoma
višne	<u>Škvritosť listov čerešní a višní</u>		2,5 g	7 dní	maximálne 3x za sezónu
jahody	<u>skladové choroby</u>		7,5 - 15 g	AT	

<u>jahody</u>	<u>Botrytída (Sivá hniloba)</u> <u>jahôd</u>		18 g	7 dní	maximálne 2x za sezónu
<u>jahody</u>	<u>gnomónia jahôd</u>		18 g	7 dní	maximálne 2x za sezónu
<u>jahody</u>	<u>drobnoplodka jahodová</u>		18 g	7 dní	maximálne 2x za sezónu
<u>maliny</u>	<u>odumieranie malín</u> <u>(Didymella applanata)</u>		10 g	14 dní	maximálne 3x za sezónu
<u>ostružina</u>	<u>škvrnitosť (Rhabdospora ruborum)</u>		10 g	14 dní	maximálne 3x za sezónu
<u>maliny</u>	<u>botrytída (Pleseň sivá)</u>		10 g	14 dní	maximálne 3x za sezónu
<u>ostružina</u>	<u>botrytída (Pleseň sivá)</u>		10 g	14 dní	maximálne 3x za sezónu
<u>ríbezle</u>	<u>botrytída (Pleseň sivá)</u>		10 g	14 dní	maximálne 3x za sezónu
<u>bobuľoviny</u>	<u>Antraknóza ríbezlí</u>		10 g	14 dní	maximálne 3x za sezónu
<u>cibuľová zelenina</u>	<u>krčková hniloba cibulovín</u>		15 g	14 dní	maximálne 2x za sezónu
<u>pór</u>	<u>alternáriová škvrnitosť</u> <u>cibuľovej zeleniny</u>		15 g	14 dní	maximálne 2x za sezónu
<u>pór</u>	<u>čerň cibulova</u> <u>(Cladosporium allii)</u>		15 g	14 dní	maximálne 2x za sezónu
<u>pór</u>	<u>hrdza cibuľová</u>		15 g	14 dní	maximálne 2x za sezónu
<u>šalát</u>	<u>podhnívanie šalátu</u> <u>(Rhizoctonia solani)</u>		15 g	14 dní	maximálne 2x za sezónu
<u>šalát</u>	<u>hniloba koreňového krčku</u> <u>šalátu (Sclerotina)</u>		15 g	14 dní	maximálne 2x za sezónu
<u>rukola</u>	<u>pleseň sivá</u>		15 g	14 dní	maximálne 2x za sezónu, poľné pestovanie
<u>endívia - čakanka</u> <u>štŕbáková</u>	<u>pleseň sivá</u>		15 g	14 dní	maximálne 2x za sezónu, skleník a pole
<u>paštrnák</u>	<u>alternáriová škvrnitosť</u>		7,5 g	14 dní	maximálne 2x za sezónu

<u>mrkva</u>	<u>alternáriová škvŕnitosť</u> <u>listov na mrkve a</u> <u>petržlene</u>		7,5 g	14 dní	maximálne 2x za sezónu
<u>petržlen</u>	<u>alternáriová škvŕnitosť</u> <u>listov na mrkve a</u> <u>petržlene</u>		7,5 g	14 dní	maximálne 2x za sezónu
<u>čierny koreň</u>	<u>alternáriová škvŕnitosť</u>		7,5 g	14 dní	maximálne 2x za sezónu
<u>chren</u>	<u>alternáriová škvŕnitosť</u>		7,5 g	14 dní	maximálne 2x za sezónu
<u>mrkva</u>	<u>Múčnatka na mrkve a</u> <u>petržlene</u>		7,5 g	14 dní	maximálne 2x za sezónu
<u>mrkva</u>	<u>biela hniloba petržlenu a</u> <u>mrkvy (Sclerotinia spp.)</u>		10 g	10 dní	maximálne 2x za sezónu
<u>petržlen</u>	<u>Múčnatka na mrkve a</u> <u>petržlene</u>		10 g	14 dní	maximálne 2x za sezónu
<u>petržlen</u>	<u>biela hniloba petržlenu a</u> <u>mrkvy (Sclerotinia spp.)</u>		10 g	14 dní	maximálne 2x za sezónu
<u>petržlen</u>	<u>hrdza petržlenová</u>		10 g	14 dní	maximálne 2x za sezónu
<u>petržlen</u>	<u>pôvodcovia hubových</u> <u>chorôb spôsobujúce</u> <u>škvŕny na listoch</u>		10 g	14 dní	maximálne 2x za sezónu
<u>zemiaky</u>	<u>alternária zemiaková</u>		2,5 g	3 dni	maximálne 4x za sezónu
<u>karfiol</u>	<u>alternária kapustová</u> <u>(Alternaria brassicæ)</u>		10 g	14 dní	maximálne 3x za sezónu, Alternaria brassiocicola, Mycosphaerella brassicicola
<u>karfiol</u>	<u>bieloplešeň belostná na</u> <u>hlúbovinách</u>		10 g	14 dní	maximálne 3x za sezónu
<u>kapustová zelenina</u>	<u>alternária kapustová</u> <u>(Alternaria brassicæ)</u>		10 g	14 dní	maximálne 3x za sezónu, Alternaria brassiocicola, Mycosphaerella brassicicola
<u>kapustová zelenina</u>	<u>bieloplešeň belostná na</u> <u>hlúbovinách</u>		10 g	14 dní	maximálne 3x za sezónu

<u>kel</u>	<u>alternária kapustová (Alternaria brassicae)</u>		10 g	14 dní	maximálne 3x za sezónu, Alternaria brassiocicola, Mycosphaerella brassicicola
<u>kel</u>	<u>bieloplešeň belostná na hlúbovinách</u>		10 g	14 dní	maximálne 3x za sezónu
<u>kel rúžičkový</u>	<u>alternária kapustová (Alternaria brassicae)</u>		10 g	14 dní	maximálne 3x za sezónu, Alternaria brassiocicola, Mycosphaerella brassicicola
<u>kel rúžičkový</u>	<u>bieloplešeň belostná na hlúbovinách</u>		10 g	14 dní	maximálne 3x za sezónu
<u>kaleráb</u>	<u>bieloplešeň belostná na hlúbovinách</u>		10 g	7 dní	maximálne 2x za sezónu
<u>špargľa</u>	<u>plešeň sivá</u>		15 g	AT	maximálne 2x za sezónu
<u>bylinky</u>	<u>septoriózy na bylinkách</u>		15 g	35 dní	maximálne 1x za sezónu
<u>bylinky</u>	<u>múčnatka na bylinkách</u>		15 g	35 dní	maximálne 1x za sezónu
<u>reďkovka</u>	<u>pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch</u>		15 g	7 dní	maximálne 2x za sezónu
<u>špenát</u>	<u>pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch</u>		15 g	14 dní	maximálne 2x za sezónu
<u>mangold</u>	<u>pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch</u>		15 g	14 dní	maximálne 2x za sezónu
<u>valeriána poľná</u>	<u>pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch</u>		15 g	14 dní	maximálne 1x za sezónu
<u>čierny koreň</u>	<u>pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch</u>		10 g	14 dní	maximálne 2x za sezónu
<u>trávniky</u>	<u>Plešeň snežná na trávniku</u>		15 g	AT	pri prvých príznakoch
<u>trávniky</u>	<u>hrdza trávna</u>		15 g	AT	pri prvých príznakoch