

## Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina	Škodlivý činiteľ	Koncentrácia v %	Dávka na 10l vody a 100m <sup>2</sup>	Čakacia lehota v dňoch	Povolené kombinácie a poznámky
<u>zemiaky</u>	<u>Pásavka zemiaková</u>		1,5-2ml	7 dní	Vyššia dávka sa použije na larvy vo vyšších štádiách (prevažuje L3)
<u>kapustová zelenina</u>	<u>Mlynárik kapustový</u>		4ml	3 dni	
<u>kapustová zelenina</u>	<u>Mora kapustová</u>		4-5ml	3 dni	Vyššia dávka sa odporúča pri vyššom výskyte škodcu.
<u>slivky</u>	<u>Obaľovač slivkový (1. generácia)</u>		4-5ml	7 dní	Vzhľadom na kratšiu ochrannú dobu sa aplikuje predovšetkým proti 2. generácii obaľovača.
<u>jablone</u>	<u>Obaľovač jablčný (1. generácia)</u>		6ml	7 dní	Aplikácia je vhodná v čase, keď chceme zasiahnuť ešte ďalších škodcov ako piliarky, hrčiarky, nosániky, podkopáčičky a pod.
<u>jablone</u>	<u>Obaľovače</u>		6ml	7 dní	Aplikácia je vhodná v čase, keď chceme zasiahnuť ešte ďalších škodcov ako piliarky, hrčiarky, nosániky, podkopáčičky a pod.
<u>vinič</u>	<u>Obaľovače na viniči</u>		2-3ml	14 dní	Vyššia dávka sa odporúča na druhú generáciu škodcov.
<u>kapustová zelenina</u>	<u>Húsenice motýľov</u>		3-4ml	3 dni	Vyššia dávka sa odporúča pri vyššom výskyte škodcu.
<u>pór</u>	<u>Strapky</u>		4ml	7 dní	
<u>cibuľa</u>	<u>Strapky</u>		4ml	7 dní	
<u>rajčiak</u>	<u>Strapky</u>	0,04%	4ml	3 dni	Aplikácia v skleníkoch.
<u>paprika</u>	<u>Strapky</u>	0,04%	4ml	3 dni	Aplikácia v skleníkoch.